

Dicoplus®

Diserbante Selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi.

Composizione

Dicamba puro (da sale dimetilamminico)	gr 1,07 (=11,2 g/l)
Mecoprop puro (da sale dimetilamminico)	gr 12,9 (=135,4 g/l)
Clopiralid (da sale monoetanolamminico)	gr 1,0 (= 10,5 g/l)
Coadiuvanti	q.b.a gr 100

ATTENZIONE: Irritante, rischio di gravi lesioni oculari.

Confezione: litri 5



Caratteristiche

- **DICOPLUS** è un diserbante ad azione rapida e completa contro le malerbe a foglia larga che infestano prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi.
- Il prodotto va impiegato su prato non falciato da alcuni giorni.
- **DICOPLUS** è particolarmente efficace nei confronti dei Trifogli (*Trifolium* spp), Camomilla (*Matricaria* spp), Camomilla dei tintori (*Anthemis tinctoria*) che si sviluppano spontaneamente nei tappeti erbosi. Il prodotto non è attivo nei confronti delle specie graminacee.

Modalità e dosi di impiego:

Coltura	Note	Dosaggio	Frequenza
Prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi	al 1° anno di impianto	5-7 l/ha (pari a 50/70 ml/100 m ²)	intervenire tra l'inizio dell'accestimento e l'inizio della levata
idem	prati affrancati (dal 2° anno in poi)	7-9 l/ha (pari a 70-90 ml/100m ²)	trattare prima del 1° sfalcio su infestanti poco sviluppate o durante tutto il periodo primaverile-estivo

Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 300-500 litri/ha (pari a 3-5 litri/100 mq) e con temperature comprese tra 12 e 25° C. Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili quali fruttiferi, orticole, ornamentali, ecc.

Compatibilità:

Il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità:

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

DA NON VENDERSI SFUSO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI



The Scotts Difference®

Norme precauzionali:

Non contaminare altre colture , alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

Informazioni per il medico:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Dicamba 1,07%

Mecoprop 12,9%

Clopivalid 1,0%

le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DICAMBA

Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia

MECOPROP

Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea, irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertemia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. OSPEDALIZZARE.

CLOPIRALID - -

avvertenza: consultare un centro antiveleni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle presenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.



The Scotts Difference®



Scotts Italia s.r.l., Viale Montegrappa 18, 31100 Treviso ♦ www.scottsiinternational.com
Tel.: (0422) 436 331 ♦ Fax: (0422) 436 332 ♦ E-mail: scottsmkt@tin.it