

Product information

FLARE GOLD G®

Fungicida sistemico granulare per la lotta contro le Peronosporacee

Caratteristiche generali

Flare Gold G è un fungicida a base di metalaxil-m, l'isomero attivo dei due isomeri costituenti la molecola di metalaxil tradizionale. Flare Gold G è un fungicida sistemico per la lotta contro malattie fungine dei generi *Pythium* e *Fitoftora*, agenti di marciumi radicali e del colletto su diverse colture. Applicato al suolo manifesta un'eccellente e prolungata azione preventiva nei confronti di questi patogeni. Il principio attivo penetra nelle radici delle piante trattate e viene trasportato e distribuito con la linfa nelle diverse parti della pianta che viene protetta dagli attacchi dei funghi del terreno, inibendo la crescita e la produzione di spore.

Modalità di applicazione

Coltura	Epoca d'impiego - Metodo	Dosi d'impiego	Cadenza trattamenti
Floricole e ornamentali (<i>Pythium</i> , <i>Fitoftora</i>)	Semina	2-4 gr/m ²	
	Pre-trapianto		Ripetere dopo 25-30 gg
	Pre-invasatura	120-140 gr/m ³	Incorporare al terriccio
Tappeti erbosi (<i>Pythium</i>)	Prati appena seminati	15-30 kg/ha	Max 3 applicazioni ad intervalli di 7-14 gg. Eventualmente irrigare
	Prati già consolidati	15-30 kg/ha	Max 3 applicazioni ad intervalli di 10-21 gg durante il periodo favorevole allo sviluppo della malattia
Conifere e latifoglie (<i>Fitoftora</i>)	Pre-impianto vivaio	20-50 g/pianta	Ripetere il trattamento dopo 3-6 mesi
	Post-impianto vivaio	50-150 g/pianta	
	Ripresa vegetativa	20-40 g/pianta	

Composizione	Formulazione	Classificazione	Confezionamento
Metalaxil-m puro 2,4 g Coformulanti q.b. a g 100	Granulare	Nocivo	Sacchi da 5 kg

Scotts Italia srl - Professional Business Group
Via Monterumici, 8 - 31100 Treviso
Tel.: + 339 0422 436331, Fax: +39 0422 436332
E-mail: infoitalia@scotts.com

Prodotto fitosanitario per l'agricoltura autorizzato dal Ministero della sanità a base di Metalaxil-m: leggere attentamente le istruzioni.
Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta.
Registrazione del Ministero della Sanità n° 10378 del 08/03/2000



Growing success