


# Linea Manutentori

## WEED CONTROL Diserbo selettivo per il controllo della foglia larga

### CARATTERISTICHE

Scotts Weedcontrol è uno speciale erbicida per tappeti erbosi (prati all'inglese, campi da golf, campi sportivi) costituiti da essenze graminacee. Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia larga.



Per tappeti erbosi costituiti da essenze graminacee, contro infestanti foglia larga come Trifoglio (*Trifolium* spp.), Piantaggine (*Plantago* spp.), Pratinella comune (*Bellis perennis*), Centocchio (*Stellaria* spp.), Veronica (*Veronica* spp.), Stoppione (*Cirsium* spp.), Vilucchio (*Convolvulus* spp.), Veccia (*Vicia* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), maranto (*Amaranthus* spp.), Papavero (*Papaver* spp.), Dente di leone (*Taraxacum officinale*).

Adatto alle fasi:

**OPERAZIONI SPECIALI**

Diserbo foglia larga

Scotts Italia srl  
Viale Monte Grappa 18, 31100 Treviso, Italia  
Tel.: +39 0422 436 331, Fax: +39 0422 436 332  
E-mail: infoitalia@scotts.com, www.scottsitalia.com



*Growing success*

## COMPOSIZIONE



2,4 D puro g 0,80 (sotto forma di sale dimetilamminico g 0,96) Dicamba puro g 0,12 (sotto forma di sale dimetilamminico g 0,14) Coformulanti q.b.a g 100

Registrazione Ministero della Sanità n.10005 del 09/04/1999

## DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Scotts Weed Control si applica alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> (2 Kg/100 m<sup>2</sup>) in primavera, estate o autunno, quando le infestanti sono in attiva crescita e su prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire meglio alla vegetazione delle infestanti. Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature spandigranuli Scotts. Non effettuare il taglio del prato 2-3 giorni prima e dopo il trattamento. Per evitare il dilavamento dei granuli dalla vegetazione e permettere al prodotto di penetrare anche attraverso l'apparato fogliare, non irrigare il prato per 24 ore dopo il trattamento e non eseguire il trattamento se è prevista una pioggia entro le 24 ore successive. Nel caso di pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento dopo 4-6 settimane. Nel caso di infestanti poco sensibili un secondo intervento può essere eseguito 4-6 settimane più tardi. Non eseguire più di due trattamenti l'anno. Da non applicare con mezzi aerei.

### SETTAGGI SPANDICONCIMI

| AccuPro                                                                             | Dossaggio (g/m <sup>2</sup> ) | Passaggio doppio                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 25 g/m <sup>2</sup>           | Settaggi Cono<br>7 M <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|                                                                                     | 30 g/m <sup>2</sup>           | 7 N                                              |
|                                                                                     | 35 g/m <sup>2</sup>           | 7 O                                              |
|                                                                                     |                               | Passaggio singolo                                |
|                                                                                     | 25 g/m <sup>2</sup>           | Settaggi Cono<br>7 Q <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|                                                                                     | 30 g/m <sup>2</sup>           | 7 S <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                  |
|                                                                                     | 35 g/m <sup>2</sup>           | 7 U                                              |
| Edge Guard                                                                          | Dossaggio (g/m <sup>2</sup> ) | Passaggio singolo                                |
|  | 25 g/m <sup>2</sup>           | 8                                                |
|                                                                                     | 30 g/m <sup>2</sup>           | 9                                                |
|                                                                                     | 35 g/m <sup>2</sup>           | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                    |



Growing success